

شماره: ۶۵۸/۲۶۵۹۱
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
پیوست: ندارد



معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: عارضه خروج از رگ داروی رمدسیویر

با سلام و احترام؛

با توجه به تعداد بالای بیماران دریافت کننده رمدسیویر بصورت سرپایی و بستری در بیمارستان های سراسر کشور، مواردی از عارضه خروج از رگ این دارو اتفاق افتاده است. لذا خواهشمند است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع بیمارستان های سراسر کشور رسانده شود.

۱- اگر چه خود داروی رمدسیویر جزء داروهای محرک رگ (وزیکانت) محسوب نمی شود ولی به علت فورمولاسیون و خاصیت اسیدی، در صورت خروج از رگ (صحیح تر نشت به بافتهای اطراف رگ) می تواند باعث آسیب بافتی، نکروز و سندروم کمپارتمنت شود.

۲- جهت پیشگیری از بروز این عارضه: استفاده از رگ مناسب، رقیق سازی در حداقل ۱۰۰ میلی لیتر سرم، تزریق حداقل در عرض یکساعت، فیکس کردن کاتتر وریدی، رگ گیری مناسب، اطمینان از عدم انسداد کاتتر قبل از تزریق دارو، شستشوی مسیر رگ قبل و بعد از تزریق کمک کننده است.

۳- در صورت مواجهه با این عارضه: ساعت بروز عارضه ثبت شود، از محل عکس گرفته شود، حاشیه ضایعه علامت زده شود، بلافاصله تزریق از رگ آسیب دیده متوقف شود، باقیمانده دارو در مسیر رگ از طریق کاتتر با سرنگ کشیده شود، سپس کاتتر خارج شود، عضو بی حرکت و فیکس شود، عضو از سطح بدن بالا نگه داشته شود، علائم بیمار ثبت شود، کمپرس گرم ممکن است کمک کند، استروئید بیمار ادامه یابد.

دکتر نوشین محمد حسینی
مدیر کل دفتر نظارت و پایش
مصرف فرآورده های سلامت محور

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir