



بسمه تعالی
فرم تدوین راهنمای تجویز



توضیحات	مدت زمان ارائه	تواتر خدمتی		محل ارائه خدمت	شرط تجویز		افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز و ارائه خدمت	کاربرد خدمت	عنوان استاندارد
		فواصل انجام	تعداد دفعات مورد نیاز		کنترا اندیکاسیون	اندیکاسیون			
عوارض دارو شامل عوارض عمده به صورت سمیت کبدی می باشد. از عوارض دیگر می توان به احتباس مایع به شکل ادم اندام، آنمی و بروز ادم ریوی در مبتلایان به PVOD اشاره نمود. PVOD= Pulmonary veno-occlusive disorder	تا زمان پاسخدهی به درمان و یا بروز عوارض و یا عدم تحمل می توان مدام العمر به مصرف دارو ادامه داد	تجویز روزانه	دارو بصورت ۱۰ میلی گرم روزانه خوراکی تجویز میگردد	دارو توسط مراکز اصلی ارایه خدمت به بیماران پرفشاری شریان ریوی و بصورت سرپایی تجویز گردد.	حاملگی شیردهی	یک آنتاگونیست گیرنده اندوتلین است که در درمان پرفشاری شریان ریوی (FCI-II) جهت کاهش ریسک پیشرفت بیماری و دفعات بستری بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.	- فوق تخصص ریه - متخصص قلب و عروق	سرپایی بستری موقت بستری	Macitentan