



معاون محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر ولایتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: مصوبات کمیته مشورتی در خصوص مدیریت بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در کلینیک های

سرپایی

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری کمیته مشورتی بررسی دستورالعمل های بیماری کووید-۱۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در خصوص مدیریت بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در کلینیک های سرپایی موارد زیر مصوب گردید:

- همه بیماران مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی نیاز به انجام CT scan ندارند، در صورت وجود علائم تنفسی CT scan درخواست می شود. شایان ذکر است در بیماران سرپایی جهت پیگیری بیماری نیاز به انجام CT scan مجدد نمی باشد.

- شرایط شروع درمان برای بیماران مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی بیمار دارای آزمایش PCR (+) به همراه علائم تنفسی و درگیری ریه در CT scan می باشد.

- داروهای توصیه شده در درمان این بیماران عبارتند از:

✓ داروهای anti inflammatory شامل: کورتیکواستروئید(خوراکی ، تزریقی) و NSAID

با دوره درمانی ۵ روزه

✓ داروهای ضدانعقاد با دوز پروفیلاکسی به مدت ۵ روز

بِسْمِ تَعَالَى

شماره ۵۴۰۰/۱۰۴۳۲
تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
پوست ندارد.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

- ✓ داروهای ضد ویروس تزریقی یا خوراکی براساس شواهد در کاهش مورتالیتی این بیماری
- تاثیر ثابت شده ندارند، ولی با صلاحدید پزشک معالج (متخصص عفونی، داخلی، ریه، طب اورژانس) در صورت وجود علایم تنفسی بلامانع می باشد.
- ✓ بر اساس نظر کمیته علمی و شواهد قطعی تجویز فاوی پیراویر اندیکاسیون ندارد.

دکتر قاسم جان بابایی



معاون درمان