



## ریاست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: پلاسما درمانی در کووید - ۱۹

با سلام

براساس نتایج گزارش شده توسط جناب آقای دکتر عشقی رئیس محترم سازمان انتقال خون و مسئول کمیته کشوری پلاسما درمانی و نظر کمیته علمی کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود:

۱- پلاسما درمانی در بیماران Critical و انتوبه تاثیر اثبات شده ای در روند بهبودی و کاهش مرگ و میر ندارد و نباید تجویز نگردد.

۲- استفاده از این روش درمانی باید در قالب کارآزمایی های بالینی بوده و در صورتیکه با نظر پزشک معالج نیاز به پلاسما درمانی باشد بهتر است در ابتدای بیماری ( ترجیحاً در ۷۲ ساعت اول) شروع گردد. لذا برای انجام آن هماهنگی های لازم بین مراکز سازمان انتقال خون هر استان و مراکز دانشگاهی جهت اهدای فراورده های خونی از بهبود یافته گان صورت پذیرد.

استفاده از IVIG در بیماران بستری فقط در صورت تصمیم گیری بالینی تحت نظر تیم ۳ نفره متشکل از پزشک معالج و دو نفر از همکاران فوق تخصص ریه / عفونی / داخلی یا فوق تخصص مراقبت های ویژه مجاز می باشد.

دکتر قاسم جان بابایی



معاون درمان