

نکات دارویی پوساکونازول تزریقی ویژه داروسازان

نام دارو	شکل دارویی	دوز دارو	شرایط نگهداری	نحوه آماده سازی	سرم سازگار برای تجویز و مدت زمان انفوزیون	پارامترهای مانیتورینگ	موارد منع مصرف	تداخلات مهم دارویی	نکات مهم
پوساکونازول	ویال حاوی ۳۰۰ میلی گرم در حجم ۱۶,۷ میلی لیتر	روز اول: ۳۰۰ میلی گرم دو بار در روز سپس ۳۰۰ میلی گرم روزانه	ویال اصلی: یخچال ویال باز شده: بلافاصله باید استفاده شود و قابل نگهداری نیست. فرآورده رقیق شده: تا ۲۴ ساعت در دمای یخچال قابل نگهداری است.	قبل از رقیق سازی باید به دمای اتاق برسد. هر ویال ۳۰۰ میلی گرم باید قبل از تزریق در ۳۰۰-۱۵۰ میلی لیتر از سرم های سازگار رقیق گردد. فرآورده بعد از رقیق سازی باید شفاف، بی رنگ تا زرد و عاری از هرگونه ذره باشد.	سرم N/S سرم H/S سرم D5W سرم D/S سرم 1/3,2/3 *فرآورده در <u>سرم رینگر</u> ناپایدار است. زمان انفوزیون هر ویال: ۹۰ دقیقه *تزریق فرآورده رقیق شده از طریق رگ مرکزی و با استفاده از ست های فیلتر دار ۲۲ صدم میکرون (PES یا PVDF) باید انجام گیرد. برای هر بار تزریق باید ست جداگانه استفاده گردد. *تنها دوز اول را می توان تا تعبیه لاین مرکزی از طریق رگ محیطی در مدت ۳۰ دقیقه انفوزیون کرد. طولانی شدن مدت زمان انفوزیون در این شرایط احتمال ترومبوفلیت را افزایش خواهد داد.	پایش عملکرد کبدی قبل از شروع و حین درمان پایش عملکرد کلیوی پایش الکترولیت های سرم قبل از شروع و حین درمان شمارش سلولهای خونی	تجویز همزمان با داروهای: سیرولیموس آلکالوئیدهای ارگوت آتورواستاتین کینیدین پیموزاید واکنش افزایش حساسیتی به هر کدام از داروهای دسته آزول ها	فرآورده مهارکننده قوی آنزیم های متابولیزه کننده در کبد می باشد لذا تجویز همزمان با برخی داروها، غلظت سرمی آنها را به میزان زیادی افزایش خواهد داد.	فرآورده irritant می باشد و تزریق آن باید از cv line صورت پذیرد. فرآورده حاوی سیکلودکستین می باشد لذا در بیماران با GFR<30 مزایای تزریق دارو در مقابل آسیب کلیوی باید توسط پزشک بررسی گردد. در بیماران دیالیزی با توجه به برداشت سیکلودکستین توسط دیالیز قابل استفاده است.

تهیه و تنظیم:

سازمان غذا و دارو

گروه خدمات بستری و سرپائی

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

شماره: ۶۵۸/۳۰۵۷۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
پیوست: دارد



معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: نکات دارویی پوساکونازول تزریقی ویژه داروسازان

با سلام؛

با احترام، همانگونه که مستحضرید داروی تزریقی پوساکونازول در حال حاضر در کشور موجود می باشد و با توجه به شرایط ویژه نگهداری، رقیق سازی و انفوزیون داروی مذکور و سوالات مطرح شده در این راستا، نکات دارویی پوساکونازول تزریقی جهت بهره برداری توسط همکاران داروساز و پاسخ به سوالات کادر درمان تهیه گشته است. لذا خواهشمند است، راهنمای مذکور به نحو مقتضی در اختیار داروسازان شاغل در بیمارستان های سراسر کشور قرار گیرد.

دکتر نوشین محمد حسینی
مدیر کل دفتر نظارت و پایش
مصرف فرآورده های سلامت محور

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمایر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

شماره: ۶۵۸/۳۰۵۷۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
پیوست: دارد


جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir